

บัญชีรายการยาสำรองบนหอผู้ป่วย

รายการยา	จำนวน	การเก็บรักษา	ความคงตัวหลังเปิดใช้
Dexamethasone injection	10 amp	<30 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที ถ้าเหลือให้ทิ้ง
Hydrocortisone injection	5 vial	<25 °C	หลังละลายผงยา 24 ชั่วโมง ที่ 25 °C
Haloperidol injection	3 amp	<30 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที ถ้าเหลือให้ทิ้ง
Berodual Nebulizer	10 bott	<30 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที ถ้าเหลือให้ทิ้ง
Salbutamol solution for nebulizer	12 vial	<30 °C	30 วัน (ป้องกันแสง)
Morphine injection	10 amp	<30 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที
Antivenum งูกะปะ	5 vial	เก็บในตู้เย็น	หลังเปิดให้ใช้ทันที
Antivenum งูเห่า	10 vial	เก็บในตู้เย็น	หลังเปิดให้ใช้ทันที
Regular insulin	2 vial	เก็บในตู้เย็น	42 วัน
Mixtard insulin	5 vial	เก็บในตู้เย็น	42 วัน
NPH insulin	2 vial	เก็บในตู้เย็น	42 วัน
BCG vaccine	1 vial	เก็บในตู้เย็น	2 ชั่วโมง ในตู้เย็น (ป้องกันแสง)
Silver cream	1 กระปุก	<25 °C	6 เดือน หรือน้อยกว่านั้น หากยาเกิดการแยกชั้น มีสีหรือเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไป
Lidocaine jelly	5 tube	<30 °C	6 เดือน หรือน้อยกว่านั้น หากยาเกิดการแยกชั้น มีสีหรือเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไป
NSS 1,000 ml	10 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
NSS 100 ml	20 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
5%DN/2 1,000 ml	10 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
5%DN/3 500 ml	5 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
5%DNSS 1,000 ml	10 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
D5W 1,000 ml	2 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
D5W 100 ml	3 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง

บัญชีรายการยาสำรองที่ห้องฉุกเฉิน

รายการยา	จำนวน	การเก็บรักษา	ความคงตัวหลังเปิดใช้
Dexamethasone injection	20 amp	<30 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที ถ้าเหลือให้ทิ้ง
Hydrocortisone injection	10 vial	<25 °C	24 ชั่วโมง หลังละลายผงยา ที่ 25 °C
Haloperidol injection	5 amp	<30 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที ถ้าเหลือให้ทิ้ง
CPM injection	15 amp	<30 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที ถ้าเหลือให้ทิ้ง
Terbutaline injection	10 amp	<25 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที ถ้าเหลือให้ทิ้ง
Triamcinolone injection	5 vial	<30 °C	48 ชั่วโมง หลังผสม ที่ 2-8 °C (หลังแช่เย็น ก่อนใช้เขย่า vial แร่จางกว่ายาจะเข้ากัน)
2% Lidocaine 50 ml	6 vial	<30 °C	30 วัน ที่ 25 °C สังเกตตะกอนและความขุ่นของยาทุกครั้งก่อนบริหารยา
1% Lidocaine + adrenaline 1:200,000 50 ml	3 vial	เก็บในตู้เย็น	7 วัน ในตู้เย็น สังเกตตะกอนและความขุ่นของยาทุกครั้งก่อนบริหารยา
Berodual Nebulizer	30 bott	<30 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที ถ้าเหลือให้ทิ้ง
Salbutamol solution for nebulizer	10 vial	<30 °C	30 วัน (ป้องกันแสง)
Alum milk	5 bott	<30 °C	30 วัน
M. Carminative	5 bott	<30 °C	30 วัน
Paracetamol syrup	5 bott	<30 °C	30 วัน
Paracetamol tab 500 mg	50 tab	<30 °C	ตามวันหมดอายุบนแผงยา
Paracetamol tab 325 mg	20 tab	<30 °C	ตามวันหมดอายุบนแผงยา
Streptokinase	1 vial	เก็บในตู้เย็น	24 ชั่วโมง หลังละลายผงยา ที่ 2-8 °C
Antivenum งูกะปะ	5 vial	เก็บในตู้เย็น	หลังเปิดให้ใช้ทันที
Antivenum งูเห่า	10 vial	เก็บในตู้เย็น	หลังเปิดให้ใช้ทันที
Regular insulin	3 vial	เก็บในตู้เย็น	42 วัน
ERIG	10 vial	เก็บในตู้เย็น	8 ชั่วโมง
CPRV	50 vial	เก็บในตู้เย็น	8 ชั่วโมง
Tetanus toxoid (TT)	50 amp	เก็บในตู้เย็น	หลังเปิดให้ใช้ทันที
Tetracaine eye drop	1 bott	เก็บในตู้เย็น	30 วัน
Hista-oph	5 bott	เก็บในตู้เย็น	ใช้ 1 คน/1 ขวด เปิดใช้แล้วให้ผู้ป่วยเลย
Chloramphenicol eye drop	5 bott	เก็บในตู้เย็น	ใช้ 1 คน/1 ขวด เปิดใช้แล้วให้ผู้ป่วยเลย
Chloramphenicol eye ointment	5 tube	เก็บในตู้เย็น	ใช้ 1 คน/1หลอด เปิดใช้แล้วให้ผู้ป่วยเลย

บัญชีรายการยาสำรองที่ห้องฉุกเฉิน

รายการยา	จำนวน	การเก็บรักษา	ความคงตัวหลังเปิดใช้
NSS 1,000 ml	20 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
NSS 100 ml	10 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
5%DN/2 1,000 ml	10 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
5%DN/3 500 ml	10 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
5%DNSS 1,000 ml	10 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
D5W 1,000 ml	5 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
D5W 500 ml	5 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
D5W 100 ml	5 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
0.45%NaCl 1,000 ml	5 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง

บัญชีรายการยาสำรองที่ห้องคลอด

รายการยา	จำนวน	การเก็บรักษา	ความคงตัวหลังเปิดใช้
Oxytocin 10U/1ml	40 amp	เก็บในตู้เย็น	24 ชั่วโมง หลังเจือจางยา ที่ 2-8 °C
Methergine 0.2mg/ml	5 amp	เก็บในตู้เย็น	หลังเปิดให้ใช้ทันที
Vitamin K1	10 amp (เบิกครั้งละ 1 กล่อง)	<25 °C	หลังเปิดให้ใช้ทันที
Nifedipine 5 mg	40 tab	15-25 °C	ตามวันหมดอายุบนแผงยา
Misoprostol 200 mcg	4 tab	<25 °C	ตามวันหมดอายุบนแผงยา
Terbutaline 0.5mg/ml	20 amp	<25 °C	48 ชั่วโมง หลังเจือจางยา ที่ 25 °C
AZT 300 mg	10 tab	<25 °C	ตามวันหมดอายุบนฉลาก prepack
NSS 1,000 ml	4 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
NSS 100 ml	2 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
5%DN/2 1,000 ml	4 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
D5W 500 ml	2 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง
D5W 100 ml	2 bott	<30 °C	24 ชั่วโมง