

ชื่อยาทั่วไป	CHLORPHENIRAMINE MALEATE
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	องค์การเภสัชกรรม
รูปแบบ / ความแรง	ยาน้ำ 2 มิลลิกรัม/ 1 ซ้อนชา (บรรจุ 60 มิลลิลิตร) ยาเม็ด 4 มิลลิกรัม ยาฉีด 10 มิลลิกรัม/ 1 มิลลิลิตร
กลุ่มยา	Antihistamine
Pregnancy Category	B
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	บรรเทาอาการหวัด อาการแพ้ เช่น แพ้สารเคมีแพ้อากาศแพ้ฝุ่นละออง บรรเทาอาการคัน ขนาดที่ใช้ <u>ยาเกิน</u> 0.35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ทุก 4-6 ชั่วโมง เด็ก อายุ 1 ปี -3 ปี 1.5 ซีซี-2.5 ซีซี (1/4-ครึ่งช้อนชา) 3 ปี- 5 ปี ครึ่ง-หนึ่งช้อนชา 5 ปี-10 ปี หนึ่ง-หนึ่งช้อนชาครึ่ง ผู้ใหญ่ 4 มิลลิกรัม/เม็ด 1 เม็ด /ครั้ง ***ยาตามขนาด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น หรือเมื่อมีอาการ*** <u>ยาฉีด</u> เด็ก กำหนดตามน้ำหนัก 0.35 มก./กก. ให้ทางหลอดเลือดดำ ผู้ใหญ่ ให้ 1 amp. ทางหลอดเลือดดำ
เภสัชวิทยา	ยับยั้งฮิสตามีนที่ตัวรับ H1 แบบแข่งขัน
เภสัชจลนศาสตร์	Metabolism เกิดขึ้นที่ตับ Excretion metabolites and parent drug (3-4 %) ถูกขับออกทาง urine โดย 35% ของยาทั้งหมดจะถูกขับออกภายในเวลา 48 ชั่วโมง Elimination Half life 20-24 ชั่วโมง
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อควรระวัง -ไม่ควรดื่มสุราระหว่างใช้ยานี้ -ควรบอกแพทย์ก่อนถ้าคุณทานยา นอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาสงบระงับ ยา คลายกล้ามเนื้อ ยากดประสาท -ทานแล้วอาจง่วงจึงไม่ควรทำงานที่ต้องใช้ความระมัดระวังและใช้สติ ข้อห้ามใช้ -ต้อหินชนิดมุมปิด (narrow-angle) ทางเดินปัสสาวะอุดตันและหีกระยะเฉียบพลัน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาจมีอาการ ปากแห้ง คอแห้ง ไม่สบายท้อง ง่วงซึม ปวดหัว ใจสั่น วิงเวียน นอน ไม่หลับ อ่อนล้า คลื่นไส้ อาเจียน มีปัญหาการมองเห็น ปัสสาวะยาก แน่นหน้าอก ปวด แสบขอดอก ผื่นขึ้น
ค่าใช้จ่ายด้านยา	ยาน้ำ 2 มิลลิกรัม/ 1 ซ้อนชา (บรรจุ 60 มิลลิลิตร) 6.5 บาท/ขวด

	ยาเม็ด 4 มิลลิกรัม 0.5 บาท/เม็ด
	ยาฉีด 10 มิลลิกรัม/ 1 มิลลิลิตร 23 บาท/ Ampule