

ชื่อยาทั่วไป	Clindamycin
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	-Capsule 300 mg -Injection 600 mg/4ml
กลุ่มยา	Clindamycin เป็น chlorine derivative ของ lincomycin
Pregnancy Category	B
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	-Clindamycin มีฤทธิ์ต่อ Streptococci, staphylococci, pneumococci, Bacteroides sp. และ anaerobic อื่นๆทั้งแกรมบวกและลบ แต่ยาไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อ enterococci, gram negative aerobic, <i>Clostridium difficile</i> -Severe anaerobic infection จากเชื้อ Bacteroides และ anaerobes อื่นๆ -ใช้ร่วมกับ aminoglycosides ในการรักษาแผลที่ช่องท้อง, การติดเชื้อที่ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง (เช่น septic abortion, pelvic abscess), และ Aspiration pneumoniae -ใช้ในการป้องกัน endocarditis ในผู้ป่วย valvular heart disease ที่เข้ารับการผ่าตัดฟัน -Clindamycin ร่วมกับ primaquine ใช้เป็น alternatives ในการรักษา <i>Pneumocystic carinii</i> ในผู้ป่วยโรคเอดส์ -Clindamycin ร่วมกับ Pyrimethamine ใช้ในการรักษา AIDS related toxoplasmosis of the brain
เภสัชวิทยา	ยาออกฤทธิ์เช่นเดียวกับ Erythromycin โดยการยับยั้ง aminoacyl translocation reaction และจับกับตำแหน่งบน 50 s subunit ของ bacterial ribosome เช่นเดียวกับ erythromycin พอดี
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	-ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ clindamycin หรือ ลิน โคมัยซิน -ควรระมัดระวังในการให้ยานี้กับผู้ป่วยสูงอายุ, ผู้มีประวัติเป็นโรกระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค ลำไส้อักเสบ, ไม่ควรฉีดเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง, ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตับและไต
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ปวดท้อง, คลื่นไส้, อาเจียน และท้องเสีย รสเปลี่ยนเป็นรสคล้ายโลหะ
ค่าใช้จ่ายด้านยา	-Capsule 300 mg 3.5 บาท -Injection 600 mg 27 บาท