

ชื่อยาทั่วไป	Domperidone
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาน้ำ 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ยาเม็ด 10 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	dopamine (D2) antagonist
Pregnancy Category	-
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่เกิดจากระบบทางเดินอาหาร ปวดแน่นไม่สบายท้อง ขนาดที่ใช้ <u>ยากิน</u> 0.5 -1 มิลลิกรัม/ 5 กิโลกรัม/ครั้ง วัน 3-4 ครั้ง -เด็ก ¼ ช้อนชา ต่อ น้ำหนักตัว 5 กก. วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร -ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร -การเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารส่วนบนผิดปกติ ขนาดยาที่แนะนำให้ใช้ คือ domeridone 10 - 20 mg วันละ 3-4 ครั้ง โดยรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาที - ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการใช้ยารักษาโรคมาร์กินสัน (dopamine agonist) ขนาดยาที่แนะนำให้ใช้คือ 20 mg ทุก 4-8 ชั่วโมง นานประมาณ 12 สัปดาห์ -ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากโรคและยา ขนาดยาที่แนะนำคือ domperidone 20 mg วันละ 3-4 ครั้ง -ใช้ในการรักษา migraine ขนาดยาที่แนะนำคือ 20 mg ทุก ๆ 4 ชั่วโมง หรืออาจ รับประทานร่วมกับ paracetamol ขนาด domperidone สูงสุดที่แนะนำคือ รับประทานวันละไม่เกิน 4 ครั้ง
เภสัชวิทยา	ยับยั้งการออกฤทธิ์ของ dopamine ในอวัยวะส่วนปลาย มีผลเพิ่มการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร เพิ่มความดันของกล้ามเนื้อหูรูดของ หลอดอาหารส่วนล่าง (lower esophageal sphincter) มีผลทำให้กระเพาะอาหาร ว่างเร็วขึ้นและลดระยะเวลาที่อาหารอยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	- ระวังการแพ้ยาในผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ หรือ ทางเดินอาหารอุดตัน - ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้สูงอายุ และผู้ที่การทำงานของ ตับและไตบกพร่อง

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาจเกิดอาการเมื่อยล้า ง่วงซึม มึนงง ปวดเกร็งท้องและลำไส้ ปากแห้ง ปวดหัว ท้องเสีย ภาวะวณกระหายยาไม่สามารถผ่าน blood brain barrier จึงพบอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบประสาทได้น้อยมาก
ค่าใช้จ่ายด้านยา	ยาน้ำ 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 6.75 บาท/ขวด ยาเม็ด 10 มิลลิกรัม 0.5 บาท/เม็ด