

ชื่อยาทั่วไป	ERGOTAMINE TARTRATE+CAFFEINE
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Cafergot®
รูปแบบ / ความแรง	Tablets (Ergotamine tartrate 1 mg+Caffeine 100 mg)
กลุ่มยา	AGENTS FOR MIGRAINE
Pregnancy Category	X
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> Acute attack of migraine and vascular headache. <u>ขนาดยา</u> Initially 2 tablets then 1 tablets 30 minute if required. Maximum 6 tablets/day, 10 tablets/week.
เภสัชวิทยา	ออกฤทธิ์ในการรักษาอาการปวดศีรษะ โดยการกระตุ้นตัวรับของสารสื่อประสาท ซีโรโทนิน (serotonin) ชนิด 1B และ 1D (5-HT <sub>1B</sub> และ 5-HT <sub>1D</sub> ) ซึ่งส่งผลให้หลอดเลือดที่ขยายตัวผิดปกติเกิดการหดตัวลงและทำให้อาการปวดศีรษะหายไป ในที่สุด นอกจากนี้ ergotamine ยังสามารถกระตุ้นตัวรับอื่นๆ ได้ ได้แก่ $\alpha$ -1 และ dopamine-2 (D <sub>2</sub> ) ซึ่งการกระตุ้นตัวรับเหล่านี้จะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากยา ergotamine
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ผู้ป่วยที่ห้ามใช้ยา ergotamine ได้แก่ - ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา ergotamine หรือสารที่เป็นอนุพันธ์ของ ergot alkaloid - ผู้ป่วยที่มีประวัติหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ( peripheral arterial disease) - ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการทำงานของตับ และไต - ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (angina) - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้ - ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ( sepsis) - ผู้หญิงตั้งครรภ์ (ทุกไตรมาส)
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	-Cardiovascular: Myocardial ischaemia & infarction, pleural or retroperitoneal fibrosis or fibrotic changes in the cardiac valves (prolonged use) - Hepatic: Impaired hepatic function - Gastrointestinal: Nausea, vomiting - Neuromuscular & skeletal: Paresthesia, pain & weakness in the extremities - Renal: Impaired renal function
ค่าใช้จ่ายค่านยา	2.25 บาท
การใช้ยา ergotamine ที่ถูกต้องเป็น อย่างไร	การใช้ยา ergotamine สำหรับรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนจะต้องใช้เฉพาะเวลาที่มีอาการปวดเท่านั้น ห้ามใช้ติดต่อกันทุกวันเพื่อป้องกันอาการปวด

	<p>ศีรษะไมเกรนเฉียบพลัน ขนาดการรับประทานยาที่เหมาะสมคือรับประทานเมื่อมีอาการปวดศีรษะไมเกรนในครั้งแรก 1 หรือ 2 เม็ด จากนั้นทุกๆ ครึ่งชั่วโมงหากอาการไม่ดีขึ้นสามารถรับประทานซ้ำอีกครั้งละ 1 เม็ด แต่ห้ามรับประทานเกิน 6 เม็ดต่อวัน และห้ามรับประทานยาเกิน 10 เม็ดต่อสัปดาห์ เนื่องจากหากรับประทาน ergotamine ในปริมาณที่มากกว่านี้อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น รวมทั้งมีอาการเจ็บหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียนมากกว่าเดิมได้</p>
--	--