

| | |
|--|---|
| ชื่อยาทั่วไป | Gentian violet |
| ชื่อการค้า / ผู้ผลิต | - |
| รูปแบบ / ความแรง | Gentian violet solution 1 % |
| กลุ่มยา | Antiseptics, Antifungals, Antibacterials |
| Pregnancy Category | ควรใช้อย่างระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์ พบว่า gentian violet เป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ (teratogenic effects) |
| ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | <p><u>ข้อบ่งใช้</u></p> <p>ใช้ทาเฉพาะที่รักษาการติดเชื้อจาก Candida albicans (monilia) ที่บริเวณผิวหนังหรือเยื่อเมือก เช่น ภายในช่องปาก ลำคอ ขาหนีบ และเล็บ กลไกการออกฤทธิ์ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ยีสต์ และ Dermatophytes เช่น เชื้อ Candida นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก โดยเฉพาะ Staphylococcus แต่ไม่มีผลต่อสปอร์ของแบคทีเรียและ acid-fast bacteria ฤทธิ์จะลดลงเมื่อมีน้ำเหลือง</p> <p><u>วิธีใช้/ขนาดยา</u></p> <p>ใช้ทาเฉพาะที่ในรูปสารละลาย วันละ 2-3 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน</p> |
| เภสัชวิทยา | - |
| เภสัชจลนศาสตร์ | - |
| ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้ | <p>ข้อห้ามใช้</p> <ol style="list-style-type: none"> ห้ามใช้ในผู้แพ้ยานี้ ห้ามใช้กับตา หยุดยาเมื่อเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ยา เมื่อใช้รักษาอาการติดเชื้อ Candida ในช่องปาก ควรทาเฉพาะที่เน้นเนื่องจากอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรง เมื่อใช้บ่อยๆ หรือเป็นเวลานาน หรือเมื่อกลิ้นยานี้ลงไป ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังและเสื้อผ้า |
| อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา | -อาจเกิดอาการระคายเคือง แพ้ หรือเนื้องอกบริเวณเยื่อเมือก กรณีที่กลืนยาลงไป --- -อาจทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร กล้องเสียง หรือหลอดลม |
| ค่าใช้จ่ายด้านยา | 4.75 บาท |