

Fatal Drug Interaction ยาที่ห้ามสั่งใช้คู่กัน โรงพยาบาลป่าพะยอม

รายการยา/กลุ่มยาที่ 1	รายการยา/กลุ่มยาที่ 2	ผลกระทบจากการใช้ร่วมกัน
Ergotamine, Methylergometrine	Azoles antifungal: Ketoconazole, Itraconazole	ระดับยา ergotamine เพิ่มขึ้น ทำให้มีอาการของ Ergotism (vasospasm and ischemia of the extremities and other tissues including the CNS, tachycardia, hypertension)
Ergotamine, Methylergometrine	Macrolides antibiotics: Clarithromycin, Erythromycin, Roxithromycin	
Ergotamine, Methylergometrine	Lopinavir, Ritonavir, Efavirenz	
Simvastatin	Lopinavir, Ritonavir	เพิ่ม risk of myopathy and rhabdomyolysis
Thioridazine	Amiodarone	เพิ่ม risk of QT-interval prolongation
Thioridazine	Fluoxetine	
Thioridazine	Propranolol	

Drug interaction ALERT (เตือนการสั่งใช้)

รายการยา/กลุ่มยาที่ 1	รายการยา/กลุ่มยาที่ 2	ผลกระทบจากการใช้ร่วมกัน
Aminoglycoside: Gentamicin, Streptomycin, Amikacin	Furosemide	เพิ่ม risk of Nephrotoxicity, Ototoxicity
Carbamazepine	Macrolides antibiotics: clarithromycin, erythromycin	เพิ่ม risk of Carbamazepine toxicity
Digoxin	Amiodarone	เพิ่ม risk of digoxin toxicity
Digoxin	Furosemide, HCTZ	เพิ่ม risk of digoxin toxicity ติดตามระดับ K, Mg
Digoxin	Verapamil	เพิ่ม risk of digoxin toxicity
Dopamine	Phenytoin sodium	hypotension , cardiac arrest
Fluoxetine	Risperidone	เพิ่ม risk of QT-interval prolongation
Propranolol	Adrenaline	increase vascular resistance เพิ่ม BP และเกิด reflex tachycardia
Warfarin	NSAIDs: Naproxen, Ibuprofen, Diclofenac, Mefenamic	เพิ่ม risk of bleeding