

แนวทางการจัดการยาฉุกเฉินและยาที่ให้ทันที (Emergency Drug & Stat Drug)

1. ยาฉุกเฉิน (Emergency Drug)

ยาฉุกเฉิน (Emergency Drug) หมายถึง ยาที่จำเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด หากไม่สามารถใช้ยาได้อย่างทันท่วงทีอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ยาฉุกเฉินทุกชนิดมีใน Emergency box มีรายการยาดังนี้

รายการยาในกล่อง Emergency box

กล่อง Emergency box ห้องฉุกเฉิน

- Adenosine injection
- Adrenaline injection
- Amiodarone injection
- 10% Calcium gluconate Injection
- Diazepam injection
- 50% Dextrose in Water 50 ml
- Dopamine injection
- 50% Magnesium sulfate injection
- Norepinephrine injection
- Nicardipine injection
- 7.5% Sodium Bicarbonate Injection
- Atropine
- Aspirin 300 mg
- Clopidogrel 75 mg
- ISDN 5 mg

กล่อง Emergency box หอผู้ป่วยใน

- Adrenaline injection
- Calcium gluconate Injection
- Diazepam injection
- 50% Dextrose in Water 50 ml
- Dopamine injection
- 50% Magnesium sulfate injection
- Potassium chloride injection
- Norepinephrine injection
- 7.5% Sodium Bicarbonate Injection
- Aspirin 300 mg
- Clopidogrel 75 mg
- ISDN 5 mg

กล่อง Emergency box ห้องคลอด

- Adrenaline injection
- 50% Dextrose in Water 50 ml
- Hydralazine injection
- 10% Magnesium sulfate injection
- 50% Magnesium sulfate injection
- 10% Calcium gluconate Injection
- 7.5% Sodium Bicarbonate Injection

แนวทางปฏิบัติ

- 1.) แพทย์สั่งใช้ยา
- 2.) พยาบาลสามารถหยิบใช้ได้ทันที
- 3.) เมื่อหน่วยงานมีการเปิดใช้กล่องยาฉุกเฉินให้นำมาเปลี่ยนกล่องใหม่ที่ห้องยาทันที พร้อมกับสติกเกอร์ชื่อผู้ป่วยที่มีรายการยาที่ใช้ไปแนบมากับกล่องฉุกเฉินเพื่อป้องกันการใช้ยาโดยไม่มีคำสั่งแพทย์
- 4.) ห้องยาตรวจสอบความถูกต้องของรายการระเอียดการใช้ยา ลงข้อมูลในแบบบันทึกการบรรจุและเบิกกล่องยาฉุกเฉินให้ครบถ้วน
- 5.) เกสซ์กรจัดการกล่องยาฉุกเฉินให้ครบถ้วนและตรวจสอบความเรียบร้อยของกล่องยาฉุกเฉินก่อนส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่

2. ยาที่ให้ทันที (Stat Drug)

ยาที่ให้ทันที (Stat Drug) หมายถึงยาที่ให้แก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน แต่ไม่ใช่ยาฉุกเฉิน (Emergency drug) หากผู้ป่วยไม่ได้รับยาจะทำให้ภาวะนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หากได้รับยาช้า

2.1 รายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน 15 นาทีหลังมีคำสั่งใช้ยา

2.1.1) รายการยาที่ไม่มีสำรองที่ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน ห้องคลอด และห้องผ่าตัด

- ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษา Septicemia
- Captopril

แนวทางปฏิบัติ

- 1.) แพทย์เขียนคำสั่งใช้ยาโดยระบุStat และแจ้งพยาบาล
- 2.) พยาบาลเบิกยาด่วนจากห้องจ่ายยา
- 3.) เภสัชกรทำการจ่ายยาภายใน 5 นาที

2.1.2) รายการยาที่มีสำรองที่ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน ห้องคลอด และห้องผ่าตัด

ยาStat ที่มีสำรองที่ห้องฉุกเฉิน

- | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| • Salbutamol Nebule | • Berodual Nebule | • Dexamethasone injection |
| • CPM injection | • Haloperidol injection | • Hydrocortisone injection |
| • Morphine injection | • Terbutaline injection | • Streptokinase |
| • Activated charcoal | • Antivenum งูกะปะ | • Antivenum งูเห่า |
| • Regular insulin | • Mixtard insulin | • NPH insulin |

ยาStat ที่มีสำรองที่หอผู้ป่วยใน

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| • Salbutamol Nebule | • Berodual Nebule | • Dexamethasone injection |
| • Haloperidol injection | • Hydrocortisone injection | • Morphine injection |

ยาStat ที่มีสำรองที่ห้องคลอด

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| • Oxytocin | • Methergine | • Vitamin K1 |
| • Nifedipine 5 mg | • Misoprostol 200 mcg | • Terbutaline injection |

ยาStat ที่มีสำรองที่ห้องผ่าตัด

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • Ephedrine injection | • Midazolam injection |
| • Fentanyl injection | • Morphine injection |

แนวทางปฏิบัติ

- 1.) แพทย์เขียนคำสั่งใช้ยาโดยระบุStat และแจ้งพยาบาล
- 2.) พยาบาลสามารถใส่ยาสำรองของห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน ห้องคลอด หรือห้องผ่าตัด

2.2 รายการยา Stat ที่ผู้ป่วยต้องได้รับภายใน 30 นาที หลังมีคำสั่งใช้ยา

- Antibiotics injection
- Metoclopramide injection
- Hyoscine injection
- Furosemide injection
- Tramadol injection
- Diclofenac injection
- รายการยาอื่นๆที่แพทย์ต้องการให้ภายใน 30 นาที (แพทย์ระบุเป็นรายเคส)

แนวทางปฏิบัติ

- 1.) แพทย์เขียนคำสั่งใช้ยาโดยระบุStat และแจ้งพยาบาล
- 2.) พยาบาลเบิกยาค่วนจากห้องจ่ายยา
- 3.) เภสัชกรทำการจ่ายยาภายใน 10 นาที