

ชื่อยาทั่วไป	SPIRONOLACTONE
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	Tablets 25 mg
กลุ่มยา	ยาขับปัสสาวะ (diuretics)
Pregnancy Category	C/D in pregnancy-induced hypertension (per expert analysis)
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> 1. รักษาภาวะบวม (edema) เนื่องจากการหลั่งฮอร์โมน aldosterone ที่มากเกินไป 2. รักษาภาวะ hypertension, primary hyperaldosterone, hypokalemia, cirrhosis of liver, nephritic syndrome, severe heart failure <u>วิธีใช้/ขนาดยา</u> - รักษาภาวะบวม (edema) : 25 - 200 มิลลิกรัม/วัน แบ่งให้ 1 - 2 ครั้ง/วัน - รักษาภาวะ hypokalemia : 25 - 100 มิลลิกรัม /วัน - รักษาภาวะ hypertension : 25 - 50 มิลลิกรัม /วัน แบ่งให้ 1 - 2 ครั้ง/วัน
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	1. ผู้ที่มีประวัติแพ้ยา spironolactone หรือส่วนประกอบอื่นๆ 2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะปัสสาวะออกน้อยผิดปกติ (anuria), acute renal insufficiency, hyperkalemia
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	-หัวใจเต้นแรงหรือเต้นไม่เป็นจังหวะ เจ็บหน้าอก สับสน คลื่นไส้ เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ -มีเลือดออก หรือมีรอยช้ำผิดปกติ เบื่ออาหาร ปวดบริเวณท้องด้านขวาส่วนบน ตาหรือตัวเหลือง มีไข้ -หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ เสียงแหบ ผื่นคัน ผื่นลมพิษ หายใจลำบาก กลืนอาหาร ลำบาก อาเจียนเป็นเลือด -ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะลำบาก ปริมาณปัสสาวะลดลง ตาพร่ามัว รู้สึกเหมือน จะเป็นลม ปากแห้ง -กระหายน้ำมากขึ้น เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้นในชาย
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1.50 บาท
คำแนะนำที่ควรให้ผู้ป่วย	1. ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง 2. การรับประทานยาพร้อมอาหารหรือนมจะช่วยลดอาการไม่สบายท้องซึ่งเกิด จากยาได้ 3. ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน 4. ไม่ควรรับประทานยานี้ก่อนนอนเนื่องจากยาจะมีผลทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น

	5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเครื่องมือที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานอยู่
--	--